

PRODOTTI LARVICIDI CONSIGLIATI

TRATTAMENTI E PRINCIPI ATTIVI

Frequenza dei trattamenti	Principio attivo consigliato
Ogni 6-7 giorni	<i>Bacillus Thuringiensis var.israelensis</i> : insetticida microbiologico formulato in compresse ma utilizzabile anche in formulazione liquida
Ogni 10-15 giorni	<i>Temephos</i> : insetticida organofosforico formulato in compresse

Per comprensibili motivi di correttezza i prodotti larvicidi consigliati non sono citati con il nome commerciale di vendita al pubblico, ma si indica il principio attivo in esso contenuto. Qualsiasi rivenditore del settore sarà in grado di individuare il prodotto o i prodotti commerciali in cui è presente il principio attivo indicato dal cliente. Prima comunque di usare i prodotti si raccomanda di **LEGGERE COMUNQUE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI** riportate sulla confezione. Il prodotto larvicida, dopo l'acquisto, dovrà essere custodito in luogo fresco, asciutto, non esposto alla luce del sole e tassativamente non raggiungibile da bambini o animali domestici e non in promiscuità con altri prodotti anche se non alimentari. Quando è possibile, si raccomanda di conservare il prodotto larvicida nel suo imballaggio originale o, comunque, di conservare l'imballaggio vuoto, finché il prodotto non sarà stato integralmente consumato. Gli eventuali foglietti illustrativi contenuti nelle confezioni dovranno essere conservati con cura ed in modo tale che ne sia possibile sempre l'immediato reperimento. Per ottenere migliori risultati, la lotta larvicida dovrebbe essere eseguita senza interruzione dall'inizio del mese di aprile sino alla fine del mese di ottobre, con eventuali anticipazioni o prolungamenti in funzione di imprevisti andamenti climatici che determinino una persistente temperatura media dell'aria non inferiore a + 10°C. La necessità di non interrompere il trattamento larvicida, rispettando quindi la frequenza prefissata dei trattamenti, dovrà orientare l'operatore 'fai da te' nella scelta del prodotto o dei prodotti da usare in rapporto alle sue possibilità di rispettare le frequenze dei trattamenti, soprattutto nei mesi tipicamente utilizzati per le vacanze. Tutti i prodotti possono essere acquistati, eventualmente previa ordinazione, presso i negozi dedicati agli operatori agricoli. L'insetticida microbiologico formulato in compresse può essere acquistato anche presso le farmacie. Si consiglia di informarsi sempre sulla disponibilità di confezioni risparmio dei prodotti che volete acquistare.

NOTE OPERATIVE GENERALI

Le raccomandazioni sotto elencate sono improntate ai più stretti principi di precauzione e devono essere interpretate come un invito ad operare secondo schemi di assoluta sicurezza, senza inutili timori di errore in operazioni certamente non consuete. Leggere attentamente le informazioni/istruzioni riportate sull'etichetta o sul foglietto illustrativo di corredo della confezione di prodotto insetticida da impiegare. In caso di dubbio, anche banale, si raccomanda di rivolgersi al venditore del prodotto o alla Unità Funzionale di Igiene e Sanità pubblica della Azienda Sanitaria, contattando preferibilmente quella della zona territorialmente competente rispetto al vostro indirizzo di abitazione o di ambiente esterno da trattare, soprattutto per risolvere dubbi di natura igienico-sanitaria, a tutela vostra e del vicinato. Si raccomanda di privilegiare l'impiego di formulazioni in compresse più semplici da gestire anche da parte di persone inesperte e, comunque, facilmente utilizzabili anche per l'approntamento di soluzioni in acqua per irrorazioni/nebulizzazioni in casi particolari. Si raccomanda di non toccare le compresse del prodotto insetticida a mani nude, ma proteggendole con guanti monouso o riutilizzabili dopo lavaggio con acqua e sapone prima di rimuoverli dalle mani. I guanti riutilizzabili dovranno essere comunque usati solo per

questa incombenza. Un'accorta manipolazione del prodotto insetticida consentirà, nella maggior parte dei casi, di evitare di toccare le compresse. Durante la manipolazione/distribuzione delle compresse di insetticida si raccomanda di non fumare, di non bere, di non mangiare, di non toccare gli occhi, il naso e la bocca. Questo invito è tassativo quando si eseguono trattamenti con insetticidi in forma liquida. In caso di contatto diretto fra il prodotto insetticida e le mani nude o qualunque altra parte scoperta del corpo si raccomanda di lavare la parte interessata con acqua tiepida e sapone. In caso di interessamento degli occhi, soprattutto con schizzi di liquido insetticida, si dovrà procedere come sopra raccomandato, ma sarà opportuno rivolgersi ad un pronto- soccorso oculistico. In caso di contatti indiretti, attraverso le mani guantate contaminate che toccano altre parti scoperte del corpo, si dovrà procedere come sopra raccomandato. Si ricorda che dai pozzetti grigliati trattati (caditoie, canalette e simili) non fuoriescono odori molesti né esalazioni pericolose per uomini ed animali.

NOTE OPERATIVE SPECIFICHE

Prima di iniziare i trattamenti larvicidi, l'operatore 'fai da te' dovrà curare la pulizia dei pozzetti grigliati e delle canalette grigliate, rimuovendo, ove occorra, fango e fogliame. Una corretta pulizia primaverile di queste strutture dovrebbe consentire di avere buone condizioni di efficacia dei prodotti larvicidi fino all'inizio dell'autunno, quando soprattutto la caduta delle foglie potrebbe determinare condizioni di intasamento delle strutture oltre che difficoltà per l'azione larvicida dei prodotti impiegati. Se verranno utilizzati i principi attivi larvicidi raccomandati, non sarà necessario fare calcoli di dosaggio, poiché i corrispondenti prodotti commerciali sono formulati in modo da assicurare una copertura larvicida adeguata introducendo nei pozzetti grigliati e nelle canalette grigliate o simili una sola compressa con la frequenza legata al principio attivo scelto. In caso di violenti temporali si raccomanda di eseguire un nuovo trattamento quattro-cinque giorni dopo che la pioggia risulterà cessata. Una osservazione attenta e periodica delle griglie dei pozzetti e delle canalette permetterà di individuare tempestivamente uno strano affollamento di zanzare adulte intorno alle griglie; il fenomeno potrà essere evidenziato colpendo con decisione le griglie. In caso di fenomeno presente, l'operatore 'fai da te' dovrà prendere atto che il trattamento larvicida non è in grado, in quella specifica situazione, di garantire livelli accettabili di densità delle zanzare adulte, eventualmente provenienti da aree circostanti non trattate correttamente o abbandonate. Una rapida e semplice indagine permetterà di sapere se il vicinato stia eseguendo o meno i trattamenti larvicidi.